*Trèfle Violet*

# *REGENT*

Pâturage

Fauche
Enrubannage

Ensilage

Caractéristiques :

| | |
|---|---|
| *Ploïdie:* | **Diploïde** |
| *Départ en végétation :* | **17 avril** |
| *Début floraison :* | **1 juin** |
| *Production annuelle moy:* | **14 T MS/ha** |

## *Choisir le Trèfle Violet REGENT pour :*

- **Sa résistance aux complexes de maladies**
- **Sa productivité estivale**
- **L'accroissement de sa pérennité**
- **Sa résistance à la verse**




**REGENT favorise la production estivale** du trèfle violet, très sensible aux périodes de sécheresse ou de fortes chaleurs.

Ce potentiel intéressant en altitude l'est aussi pour les prairies fortement dosées en légumineuses qui présentant une première coupe souvent faible, doivent obtenir en été une production plus importante.




Source CTPS

**SEMIS :**
**En pur :** 25 kg/ha

- **En association :** 10/ 15 kg/ha avec 10/ 15 kg/ha RGI/ RGH

**Une variété LORAS**
*Produite et distribuée par :*

**GRAINES LORAS SA**
*Avenue de la Poterie- BP 50*
*69890 La Tour de Salvagny*
04 78 48 02 40 04 78 48 00 32
**www.grainesloras.com**
**www.prairie-couvert-oad.com**

*Votre Contact :*

*© GRAINES LORAS SA - Tous droits réservés*
*Les informations fournies sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques, agronomiques et des techniques culturales*

Avec l'âge, la teneur en fibres du trèfle violet augmente et favorise l'assimilation des aliments et donc la valorisation du fourrage par l'animal. **La sélection REGENT améliore la pérennité** en prolonge avantageusement le délai pendant lequel le trèfle pourra se développer. Un avantage précieux en particulier pour les prairies de moyenne durée, majoritairement exploitées pour leur foin.




S

**REGENT offre une protection utile contre les risques de verse** (circulation de la sève interrompue, maladies à la base de la tige, etc.). Ceci est utile en particulier pour les associations, souvent plus denses (la base des tiges n'est pas forcément rigidifiée) et pour qui la sensibilité à la verse est accentuée.




Sources CTPS

La sélection **REGENT** est le résultat d'une sélection nouvelle, axée sur la **résistance du trèfle violet aux complexes des maladies** susceptibles de réduire la productivité et la pérennité de la plante.

En effet, bien que le Sclérotinia soit la maladie la plus souvent constatée à la sortie de l'hiver sur trèfle violet (pourrissement des pieds), les conditions s'y prêtant, elle est rarement seule.

Le plus souvent exploité en association avec d'autres espèces fourragères, le trèfle violet se développe de surcroît dans un environnement exigeant où les risques sanitaires sont multipliés.




Source CTPS Témoins 2016

*Source INRA*

| | Ensilage | | | Enrubannage (mi fané) | | | Foin séché au sol | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UFL /kg MS | PDIN g/kg MS | PDIE g/kg MS | UFL /kg MS | PDIN g/kg MS | PDIE g/kg MS | UFL /kg MS | PDIN g/kg MS | PDIE g/kg MS |
| 1er Cycle bourgeonnement | 0,86[1] | 103[1] | 70[1] | 0,77 | 104 | 80 | 0,67 | 110 | 89 |
| 2e Cycle à 7 sem. repousse | 0,81 | 108 | 67 | 0,73 | 111 | 78 | 0,65 | 116 | 90 |




Légumineuse la plus facile à associer à une graminée, le trèfle violet présente aujourd'hui de nombreux avantages pour les éleveurs dans leurs systèmes fourragers.

La nouvelle sélection **REGENT** est une nouvelle avancée dans l'amélioration des conditions d'exploitation et d'association de cette culture.

- Plus résistant aux complexes de maladies
- Plus productif en été en particulier
- Plus pérenne
- Moins sensible à la verse